

## Impfung gegen Erkrankungen durch Meningokokken Typ B - Bexsero®



PRIVATÄRZTLICHE  
PRAXIS FÜR KINDER  
UND JUGENDLICHE

DR. MED NADINE SCHEFF

### Was sind Meningokokken?

Meningokokken sind Erreger der eitrigen Hirnhautentzündung und der sogenannten Sepsis (schwere überflutende Entzündungsreaktion des Körpers). Auch andere Erreger können diese Krankheitsbilder auslösen. Gegen Pneumokokken und Haemophilus influenza Typ B kann seit längerem geimpft werden (STIKO-Empfehlung bereits im 1. Lebensjahr).

Es gibt jedes Jahr in Deutschland etwa 150-250 Erkrankungen durch Meningokokken. Dies sind nicht viele Fälle, jedoch ist der Verlauf meist sehr schwerwiegend; tödliche Verläufe kommen vor. Schwere Defektheilungen und Behinderungen können zurückbleiben. Die Altersgipfel liegen im 1. und 2. Lebensjahr und im Jugendalter.

### Was sagt die STIKO zur Impfung?

Von der Ständigen Impfkommission (STIKO) wird derzeit die Impfung gegen Meningokokken der Serogruppe C für alle Kinder im Alter von 12 Monaten empfohlen. Bei Vorliegen eines erhöhten Risikos für Meningokokken-Erkrankungen sollten Säuglinge, Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit einem Meningokokken ACWY-Konjugatimpfstoff sowie mit einem Meningokokken-B-Impfstoff geimpft werden. Diese Indikation liegt insbesondere bei einer Immunschwäche vor.

Um eine generelle Impfempfehlung gegen Meningokokken Typ B auszusprechen, benötigt die STIKO umfangreiche Daten. Da zum jetzigen Zeitpunkt die Evidenzlage zur Impfung noch nicht ausreichend ist und eine niedrige Meningokokken B (MenB)-Krankheitslast in Deutschland vorliegt, hat die STIKO entschieden, mit der Bewertung für eine mögliche Routineimpfehlung zu warten. Es wird konkret diskutiert die Impfung evtl. Anfang 2024 mit in den Impfkalender aufzunehmen.

### Was ist möglich?

Durch die hohen Impfquoten gegen Men C sehen wir hierdurch nur noch wenige Erkrankungen. Typ B und Typ Y sind derzeit die vorherrschenden Serotypen, die invasive Infektionen verursachen.

Da insbesondere der Serotyp Y auf dem Vormarsch ist, kann grundsätzlich erwogen werden anstelle der Meningokokken Typ C Impfung ein Kombinationspräparat gegen die Serotypen ACWY anzuwenden. Gegen Meningokokken Typ B kann ergänzend geimpft werden.

## Kosten

Wenn Sie die Meningokokken-ACWY oder Meningokokken B-Impfung für Ihr Kind wünschen, nehmen Sie bitte zunächst Kontakt mit Ihrer Krankenkasse auf um die Kostenübernahme zu klären.

## Impfabstände und Durchführung Bexsero®(Men B)

	1. Impfung	2. Impfung	3. Impfung	4. Impfung
2- 5 Monate	Tag 0 (2 Mo)	8 Wo nach 1.	mit 12-15 Mo	nein
6-11 Monate	Tag 0	3 Mo nach 1.	mit ca. 18 Mo	nein
12-23 Monate	Tag 0	3 Mo nach 1.	1-2 Jahre nach 2. Impfung	nein
2-10 Jahre	Tag 0	2-3 Mo nach 1.	nein	nein
ab 11 Jahren	Tag 0	mind. 1 Mo nach 1. Impfung	nein	nein

Es werden Symptome beschrieben, die auch bei anderen Impfungen auftreten können. Gerne geben wir Ihnen die ausführliche Impfaufklärung des Deutschen Grünen Kreuzes. Sprechen Sie uns an.

Quelle: [www.rki.de/FAQ/Meningokokken](http://www.rki.de/FAQ/Meningokokken) und Fachinformation Bexsero®- modifiziert und ergänzt durch Dr. Scheff – Stand 17.10.2023

Die Impfentscheidung liegt bei Ihnen.  
Gerne klären wir Fragen in einem persönlichen Gespräch!

Dr. Nadine Scheff und Praxisteam