IMPFKALENDER

Nach den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO) 2025 (Stand November 2025)

Empfohlener Impfzeitpunkt	Alter in Wochen	Alter in Monaten								Alter in Jahren					
Impfung gegen	0 6	2	3	4	5-7	8-10		12	15	2-4	5-6	7-8		15-16	
	U2/U3 U4				U5 U6				U7a/U8	U9	U10	U11/J1		J2	
RSV*	monoklonaler Antikörper (mAK)				Nachholtermin										
Rotaviren ^a	G	1	G2	(G3)											
Wundstarrkrampf (Tetanus) ^b		G1		G2			G3 ^c				A1		А	.2	
Diphtherie		G1		G2			G3 ^c				A1		А	2	
Keuchhusten (Pertussis) ^b		G1		G2			G3 ^c				A1		А	.2	
Kinderlähmung (Poliomyelitis) ^b		G1		G2			G3 ^c			4			A	.1	
Hepatitis B ^b		G1		G2			G3 ^c				是实代	0		000	
Hib ^b (Haemophilus influenzae Typ b)		G1		G2			G3 ^c			8	ST TO				3
Pneumokokken ^b		G1		G2			G3 ^c						N P	BAL	AT .
Meningokokken B		G1		G2				G3 ^{c,d}							
Masern, Mumps, Röteln (MMR)				_0			G1		G2						5
Windpocken (Varizellen)				(31)			G1		G2						M.
HPV (Humane Papillomviren)			Control of the contro	3									G1e G	2 ^e	
Meningokokken ACWY													G1	f	

- * Einmaldosis: Geburtstermin Apr. Sept.: RSV-mAK-Gabe im Herbst vor RSV-Saison; Geburtstermin Okt. März: RSV-mAK-Gabe bei U2
- # Impfungen können auf mehrere Termine verteilt werden
- a 1. Dosis spätestens mit 12 Lebenswochen, je nach Impfstoff 2 oder 3 Impfungen
- b Frühgeborene: zusätzliche Impfdosis im Alter von 3 Monaten (insgesamt 4 Impfungen)
- c Abstand zur letzten Dosis: mindestens 6 Monate
- d 3 Impfungen bei Impfung im Alter von 2 bis 23 Monaten, 2 Impfungen ab dem Alter von 2 Jahren
- e Für Mädchen und Jungen von 9 bis 14 Jahre (2 Impfungen im Mindestabstand von 5 Monaten), Nachholimpfungen bis einschließlich 17 Jahre (3 Impfungen)
- f Für 12- bis 14-Jährige 1-malige Impfung (unabhängig vom Impfstatus); Nachholimpfung bis zum 25. Geburtstag

Ziel muss sein, möglichst frühzeitig einen vollständigen Impfschutz zu erreichen. Abweichungen sind möglich und ggf. notwendig.

